

Наркотикам - нет

The image features a close-up of a person's eye, which is light blue and looking directly at the viewer. A syringe needle is positioned just above the eye, pointing downwards. In the foreground, several other syringes are lined up, slightly out of focus, creating a sense of depth. The background is dark and blurred.


**Выполнила: Авдеева Елизавета 9 класс
ГБОУ СОШ № 901, г. МОСКВА 2012 год**

Стадии развития наркомании




- Первая стадия – стадия влечения к наркотику
- Возрастает зависимость и толерантность;
- Нужно увеличивать дозу наркотического вещества для того, чтобы человек мог почувствовать ту же самую эйфорию, что и при первом употреблении наркотика.
- В перерывах между приемом наркотиков человек начинает чувствовать сниженную работоспособность, дискомфорт.
- Данная стадия в зависимости от вида наркотика может продолжаться от одного до шести месяцев.

24 часа



**Вкалываю
с утра
до вечера!**

- Вторая стадия наркомании
- Употребление наркотика становится регулярным, предел переносимости наркотика достигнут, поэтому заметного роста дозировок больше нет;
- Наркотическое действие теряет свою специфику и сначала приводит к возбуждению, а затем и вовсе к тонизации;
- Если человек сознателен, то на второй стадии наркомании он осознает свою зависимость и пытается с ней бороться;
- Появляется физическая зависимость. Человек может чувствовать себя нормально только тогда, когда он принимает наркотик. Человек не может удержаться от приема наркотиков даже непродолжительное время, без наркотика ему становится очень плохо;



- Абстинентный синдром при прекращении приема наркотиков становится более ярким, чем раньше. Человек чувствует себя скверно и ищет возможность получить новую дозу наркотического вещества;
- Ухудшается общее состояние здоровья человека. Появляются осложнения в организме человека, которые специфичны для употребления наркотических веществ;
- Разрушаются жизненно важные органы человека, после чего толерантность к наркотику падает. Человек начинает применять наркотическое вещество просто для того, чтобы снять боль.



- Третья стадия – финальная
- Все системы организма затронуты. Психика больного меняется, проявляются соматические нарушения. Человека постоянно мучают боли, поносы, рвота. Appetit снижается до нуля. Внешний вид наркомана на третьей стадии говорит сам за себя – в молодом возрасте человек выглядит как пожилой человек;
- У человека часто меняется настроение. Человек не может достичь эйфории, хотя слабое действие наркотика все равно остается;
- Контроль за поведением слабеет;
- Взаимоотношения с людьми разрушаются окончательно. Пропадает цель в жизни, человек живет только наркотиком;
- Финиш.

Жизнь наркомана



- Ниже на фотографиях **жизнь наркоманки Татьяны** (29 лет), она ВИЧ-инфицирована. Когда-то Татьяна работала на хлебозаводе, затем потеряла работу. Начала принимать наркотики. У Татьяны очень быстро развилась зависимость от наркотиков.



- Постепенно доходы Тани стали падать и она была вынуждена принимать дешевый наркотик дезоморфин (крокодил). Смертность от дезоморфина очень высока, в течение 1-2 лет умирает 80% процентов наркоманов принимающих дезоморфин, остальные 20% умирают чуть позже (3-4 года). Дезоморфин вызывает тромбоз вен, некрозы тканей, способствует распространению инфекции по всему телу. Не редки случаи, когда в головном мозге наркомана формируется гнойный абсцесс.



- Достаточно 5 уколов, чтобы конечности буквально начали загнивать. Вены наркомана быстро приходят в негодность и он вынужден колоться в другие места, способствуя распространению некрозов и инфекции.



- Очень быстро наркоманы теряют способность передвигаться, и попадают в стационар. Медики вынуждены ампутировать гангренозную конечность, для того чтобы хоть как то продлить жизнь. О выздоровлении не может быть и речи.



- Так и у Татьяны развился глубокий некроз тканей левой голени. Подруги наркоманки помогают ей убирать некротизированную ткань, но это не даст ничего хорошего, т.к. у Тани ослаблен иммунитет и те условия не позволяют сделать нормальный туалет раны.

Реабилитация наркоманов



- Когда снят абстинентный синдром, нужно, чтобы человек начал ценить позитивный образ жизни, и наслаждался им. Реабилитация больных в таких случаях — жизненно важный фактор, от которого будет зависеть судьба человека.



- Статистика показывает, что большинство наркоманов после того как сняты болевые и другие симптомы, являющиеся последствиями наркотической зависимости, снова возвращаются к наркомании. Реабилитация больных наркоманией позволяет покончить с наркозависимостью навсегда. В современных методиках реабилитации предусмотрено создание здоровой мотивации, в результате которой больной начинает увлекаться жизнью, у него формируется другая система ценностей.



○ Стационарная реабилитация

На этом этапе пациент находится в реабилитационном центре. Эта стадия нацелена на восстановление внутреннего равновесия, а также на то, чтобы не был допущен повторный срыв. Здесь на пациента эффективно действуют три метода:

- психотерапия;
- психотренинги;
- фармакологическая терапия.




- Кроме этого, стационарной реабилитацией предусматривается временное ограждение пациента от окружающего мира, проводятся досуговые мероприятия и лечебная физкультура.



○ *Амбулаторная реабилитация*


Когда оканчивается стационарная реабилитация, за ней следует этап, который проходит в домашних условиях. Под амбулаторной реабилитацией понимается посещение психотерапевта дважды в неделю, прием необходимых препаратов и консультация с врачом.

Статистика наркомании по Регионам России



- Московская область
- Москва
- Санкт-Петербург
- Иркутская область
- Свердловская область
- Оренбургская область
- Калининградская область

Статистика наркомании в мире





Obninsk.Name



частная коллекция от
Андрейча ;)



частная коллекция от
Андрейча ;)



Используемая литература:

1. Р.Р.Гарифулин «Скрытая профилактика наркомании»
2. А.Н.Маюров «Наркотики, выход из наркотического круга»
3. Различные сайты интернета